

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности рыбы и рыбной
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)

Нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5

I. Морская и океаническая рыба

1. Лосось атлантический (семга)	Salmo salar	лосось атлантический (семга)	72,0	1-я группа – 72 % и менее
2. Кижуч	Oncorhynchus kisutch	кижуч	72,0	—"
3. Сериолелла	Seriola bama	сериолелла	72,0	—"
4. Сима	Oncorhynchus masou	сима	72,0	—"



Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
5. Палтус черный гренландский	Reinhardtius hippoglossoides	палтус	74,0	2-я группа – более 72 %, но не более 74 %
6. Тунец обыкновенный (синеперый, синий, красный, восточный)	Thunnus thynnus	тунец	74,0	—"
7. Скумбрия японская (япономорская, восточная, курильская)	Scomber japonicus (Pneumatophorus japonicus)	скумбрия курильская	74,0	—"
8. Масляная рыба	Hyperoglyphe perciformis	масляная рыба	74,0	—"
9. Гипероглиф	Hyperoglyphe antarctica	масляная рыба	74,0	—"
10. Масляная рыба обыкновенная	Hyperoglyphe pringlei	масляная рыба	74,0	—"
11. Кета	Oncorhynchus keta	кета	76,0	3-я группа – более 74 %, но не более 76 %
12. Тунец желтоперый (тунец желтохвостый)	Thunnus albacares	тунец	76,0	—"
13. Тунец большеглазый	Thunnus obesus (Parathunnus obesus)	тунец	76,0	—"

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
14. Длиннохвостый тунец (австралийский тунец)	Thunnus tonggol (Thunnus rara)	тунец	76,0	3-я группа – более 74 %, но не более 76 %
15. Тунец длинноперый (белый тунец, длиннокрылый, альбакор)	Germo alalunga	тунец	76,0	—"–
16. Скумбрия атлантическая (обыкновенная, полосатая, макрель)	Scomber scombrus	скумбрия атлантическая	76,0	—"–
17. Лец морской обыкновенный (атлантический морской, брама)	Brama brama	лец морской	76,0	—"–
18. Кефаль золотистая (сингиль)	Mugil auratus, Mugil cephalus	кефаль океаническая	76,0	—"–
19. Лаврак обыкновенный (морской волк)	Dicentrarchus labrax	лаврак	78,0	4-я группа – более 76 %, но не более 78 %
20. Пристипома бурая (ворчун-боло, каштановая, хрюкальщик, полосатый серебристый ворчун)	Pomadasys bennetti, Pomadasys hasta (P. manadensis)	пристипома	78,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
21. Терпуг южный (терпуг японский)	<i>Hexagrammos otakii</i>	терпуг	78,0	4-я группа – более 76 %, но не более 78 %
22. Луфарь	<i>Pomatomus saltatrix</i>	луфарь океанический	78,0	—"–
23. Ставрида треке	<i>Trachurus trecae</i>	ставрида океаническая	78,0	—"–
24. Ставрида перуанская (тихоокеанская)	<i>Trachurus symmetricus murphyi</i>	ставрида океаническая	78,0	—"–
25. Ставрида обыкновенная	<i>Trachurus trachurus</i>	ставрида океаническая	78,0	—"–
26. Луциан серый, краснохвостый, парго, красный	<i>Lutjanus griseus</i> , <i>Lutjanus synagris</i> , <i>Lutjanus analis</i> , <i>Lutjanus aya</i>	лутьян океанический	78,0	—"–
27. Сериола большая	<i>Seriolla dumerili</i>	сериола	78,0	—"–
28. Серебристый капитанский горбыль	<i>Otolithus brachygnathus</i>	рыба-капитан	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
29. Капитанский горбыль	<i>Pseudotolithus moorii</i>	рыба-капитан	80,0	—"–
30. Сенегальский (большеротый) капитанский горбыль	<i>Pseudotolithus senegalensis</i>	рыба-капитан	80,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
31. Скумбрия калифорнийская (восточно-тихоокеанская)	<i>Scomber japonicus diego</i> (<i>Pneumatophorus diego</i>)	скумбрия дальневосточная	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
32. Солнечник	<i>Zeus faber</i>	солнечник	80,0	—"–
33. Пиленгас (кефаль)	<i>Mugil soiuy</i>	пиленгас	80,0	—"–
34. Лепидоп хвостатый	<i>Lepidopus caudatus</i>	сабля-рыба океаническая	80,0	—"–
35. Сабля-рыба обыкновенная	<i>Trichiurus lepturus</i>	сабля-рыба океаническая	80,0	—"–
36. Сабля-рыба черная	<i>Aphanopus carbo</i>	сабля-рыба океаническая	80,0	—"–
37. Карась кантарус	<i>Spondylisoma cantharus</i>	карась океанический	80,0	—"–
38. Карась полосатый	<i>Diplodus vulgaris</i>	карась океанический	80,0	—"–
39. Пагель серебристый (пятнистый, канарский)	<i>Pagellus</i> sp.	карась океанический	80,0	—"–
40. Клювач тихоокеанский	<i>Sebastes alutus</i>	окунь морской	80,0	—"–
41. Окунь морской золотистый	<i>Sebastes marinus</i>	окунь морской	80,0	—"–
42. Шипошек аляскинский	<i>Sebastolobus alascanus</i>	окунь морской	80,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
43. Окунь синеротый	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	окунь морской	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
44. Окунь бычий глаз	<i>Priacanthus arenatus</i>	окунь морской	80,0	—"
45. Окунь голубой	<i>Sebastes mystinus</i>	окунь морской	80,0	—"
46. Окунь лимонный	<i>Holanthias fronticinctus</i>	окунь морской	80,0	—"
47. Окунь клюворылый	<i>Sebastes mentella</i>	окунь морской	80,0	—"
48. Окунь гигант	<i>Sebastes introniger</i>	окунь морской	80,0	—"
49. Зубан большеглазый	<i>Dentex sp.</i>	зубан	80,0	—"
50. Мольва голубая	<i>Molva dypterygia</i>	щука морская	80,0	—"
51. Берикс низкотелый	<i>Beryx splendens</i>	берикс	80,0	—"
52. Пальцепер десятипалый (полинемус)	<i>Galeoides decadactylus</i>	пальцепер	80,0	—"
53. Мероу гигантский (бурый группер)	<i>Epinephelus marginatus</i>	мероу	80,0	—"
54. Мероу полосатый	<i>Epinephelus aeneus</i>	мероу	80,0	—"

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
55. Салака (балтийская сельдь)	<i>Clupea harengus membras</i>	салака (балтийская сельдь)	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
56. Щука белокровная (щуковидная белокровка, ледовая рыба, ледяная рыба)	<i>Champscephalus gunnari</i> , <i>Champscephalus aceratus</i> , <i>Chaenodraco wilsoni</i>	ледяная рыба	82,0	—"–
57. Терпуг зубатый (змеезуб, офиодон)	<i>Ophiodon elongatus</i>	терпуг	82,0	—"–
58. Навага дальневосточная (вахня)	<i>Eleginus gracilis</i>	навага	82,0	—"–
59. Навага северная	<i>Eleginus navaga</i>	навага	82,0	—"–
60. Нототения зеленая (бычок океанический)	<i>Notothenia gibberifrons</i>	бычок океанический	82,0	—"–
61. Нототения мраморная	<i>Notothenia rossi</i> (<i>Notothenia rossi marmorata</i>)	нототения мраморная	82,0	—"–
62. Сельдь атлантическая (атлантичеко-скандинавская, норвежская, мурманская, многопозвонковая, океаническая)	<i>Clupea harengus harengus</i>	сельдь атлантическая	82,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
63. Сельдь тихоокеанская (восточная, малоопозвонковая)	<i>Clupea harengus pallasii</i>	сельдь тихоокеанская	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
64. Хек серебристый (серебристая мерлуза, североамериканская мерлуза)	<i>Merluccius bilinearis</i>	хек серебристый	82,0	—"
65. Мерлуза аргентинская (патагонская, патагонский хек)	<i>Merluccius hubbsi</i>	хек серебристый	82,0	—"
66. Сенегальская мерлуза (черный или сенегальский хек)	<i>Merluccius senegalensis</i>	хек серебристый	82,0	—"
67. Мерлуза капская (южноафриканская, хек капский)	<i>Merluccius capensis</i>	хек серебристый	82,0	—"
68. Горбуша	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	горбуша	82,0	—"
69. Судак	<i>Stizostedion lucioperca</i>	судак	82,0	—"
70. Бельдюга европейская	<i>Zoarces viviparus</i>	бельдюга океаническая	82,0	—"
71. Палтус стрелозубый	<i>Atheresthes evermanni</i>	палтус	82,0	—"

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
72. Палтус белокорый (обыкновенный, атлантический)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	палтус	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
73. Палтус белокорый (тихоокеанский)	<i>Hippoglossus stenolepis</i>	палтус	82,0	—"–
74. Камбала атлантическая длинная (камбала красная)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	камбала	82,0	—"–
75. Камбала морская (обыкновенная)	<i>Pleuronectes platessa</i>	камбала	82,0	—"–
76. Камбала малоротая	<i>Glyptocephalus stelleri</i>	камбала	82,0	—"–
77. Камбала-тюрбо (большой ромб, калкан)	<i>Scophthalmus maximus</i>	тюрбо	82,0	—"–
78. Камбала палтусовидная	<i>Hippoglossoides elassodon</i>	камбала	82,0	—"–
79. Камбала морская (обыкновенная, платесса, плоскуша)	<i>Pleuronectes platessa</i> (<i>Platessa platessa</i>)	камбала	82,0	—"–
80. Камбала звездчатая (тихоокеанская речная)	<i>Platichthys stellatus</i>	камбала	82,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
81. Камбала желтобрюхая	<i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>	камбала	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
82. Сайда	<i>Pollachius virens</i>	сайда	82,0	—"–
83. Пикша	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	пикша	83,0	7-я группа – более 82 %, но не более 83 %
84. Треска тихоокеанская	<i>Gadus macrocephalus</i>	треска	83,0	—"–
85. Треска атлантическая	<i>Gadus morhua morhua</i>	треска	83,0	—"–
86. Треска балтийская	<i>Gadus morhua callarias</i>	треска	83,0	—"–
87. Путассу южная	<i>Micromesistius australis</i>	путассу	83,0	—"–
88. Путассу северная (беянка)	<i>Micromesistius poutassou</i>	путассу	83,0	—"–
89. Зубатка пятнистая (пестрая)	<i>Anarhichas minor</i>	зубатка пятнистая	83,0	—"–
90. Хек тихоокеанский (орегонская, тихоокеанская или северная мерлуза)	<i>Merluccius productus</i>	хек тихоокеанский	84,0	8-я группа – более 83 %, но не более 84 %
91. Камбала-ерш (европейская палтусовидная камбала)	<i>Hippoglossoides platessoides limandoides</i>	камбала атлантическая	84,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
92. Камбала желтоперая	<i>Limanda aspera</i>	камбала желтоперая	84,0	8-я группа – более 83 %, но не более 84 %
93. Налим морской красный	<i>Urophycis chuss</i>	налим морской	84,0	—"–
94. Налим морской белый	<i>Urophycis tenuis</i>	налим морской	84,0	—"–
95. Макруронус американский	<i>Macruronus magellanicus</i>	макруронус	84,0	—"–
96. Минтай	<i>Theragra chalcogramma</i>	минтай	84,0	—"–
97. Палтус черный (синекорый)	<i>Reinhardtius hippoglossoides matsuurae</i>	палтус	86,0	9-я группа – более 84 %, но не более 86 %
98. Макрурус гребенчато- чешуйный	<i>Macrourus carinatus</i>	макрурус	86,0	—"–
99. Макрурус северный	<i>Macrourus berglax</i>	макрурус	86,0	—"–
100. Макрурус южно- атлантический	<i>Coryphaenoides holotrachys</i>	макрурус	86,0	—"–
101. Талисман	<i>Aleporcephalus sp.</i>	гладкоголов	90,0	10-я группа – более 86 %, но не более 90 %

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5

II. Рыба внутренних водоемов

102. Омуль арктический	<i>Coregonus autumnalis</i>	омуль	72,0	1-я группа – 72% и менее
103. Белый амурский лещ	<i>Parabramis pekinensis</i>	лещ	72,0	—"
104. Сахалинский таймень (чевица, гой)	<i>Hucho perryi</i>	таймень	72,0	—"
105. Амурский (уссурийский) сиг	<i>Coregonus ussuriensis</i>	сиг	74,0	2-я группа – более 72 %, но не более 74 %
106. Севрюга	<i>Acipenser stellatus</i>	севрюга	74,0	—"
107. Голец	<i>Salvelinus alpinus</i>	голец	74,0	—"
108. Русский осетр	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	осетр	74,0	—"
109. Форель радужная	<i>Salmo irideus</i>	форель радужная	76,0	3-я группа – более 74 %, но не более 76 %
110. Амурский осетр	<i>Acipenser schrenckii</i>	амурский осетр	76,0	—"
111. Черный байкальский хариус	<i>Thymallus arcticus baicalensis</i>	черный байкальский хариус	76,0	—"

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
112. Восточная красноперка (угай)	<i>Leuciscus brandti</i>	восточная красноперка (угай)	76,0	3-я группа – более 74 %, но не более 76 %
113. Омуль байкальский	<i>Coregonus autumnalis migratorius</i>	омуль байкальский	76,0	—"–
114. Амурский хариус	<i>Thumallus arcticus grubei</i>	амурский хариус	78,0	4-я группа – более 76 %, но не более 78 %
115. Жерех	<i>Aspius aspius</i>	жерех	78,0	—"–
116. Камчатский хариус	<i>Thymallus arcticus grubei natio mertensi</i>	камчатский хариус	78,0	—"–
117. Таймень	<i>Hucho taimen</i>	таймень	78,0	—"–
118. Сом	<i>Silurus glanis</i>	сом	78,0	—"–
119. Байкальский сиг (сиг, маломорский сиг)	<i>Coregonus lavaretus baicalensis</i>	байкальский сиг	78,0	—"–
120. Пангасиус	<i>Pangasius hypophthalmus</i>	пангасиус	78,0	—"–
121. Карась серебряный	<i>Carassius auratus gibelio</i>	карась серебряный	78,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
122. Сазан	<i>Cyprinus carpio</i>	сазан	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
123. Пыжьян (сибирский сиг)	<i>Coregonus lavaretus pidschian</i>	пыжьян	80,0	—"–
124. Волховский сиг (сиг, сига́лов)	<i>Coregonus lavaretus baeri</i>	сиг	80,0	—"–
125. Ле́щ (ля́щ, чеба́к, беле́к)	<i>Abramis brama</i>	ле́щ	80,0	—"–
126. Сибирский осетр	<i>Acipenser baerii</i>	сибирский осетр	80,0	—"–
127. Стерлядь	<i>Acipenser ruthenus</i>	стерлядь	80,0	—"–
128. Карп	<i>Cyprinus carpio</i>	карп	80,0	—"–
129. Толстолобик белый	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> Val.	толстолобик белый	80,0	—"–
130. Красноперка	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	красноперка	80,0	—"–
131. Амур белый	<i>Ctenopharyngodon idella</i> Val.	амур белый	80,0	—"–
132. Амур черный	<i>Mylopharyngodon piceus</i> Rich.	амур черный	80,0	—"–
133. Буффало	<i>Ictiobus bubalus</i> Raf.	буффало	80,0	—"–

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
134. Толстолобик пестрый	<i>Aristichthys nobilis</i> Rich.	толстолобик пестрый	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
135. Толстолобик	<i>Aristichthys vinogradovy</i>	толстолобик	82,0	—"
136. Атлантический (балтийский) осетр	<i>Acipenser sturio</i>	атлантический (балтийский) осетр	82,0	—"
137. Окунь	<i>Perca fluviatilis</i>	окунь	82,0	—"
138. Щука	<i>Esox lucius</i>	щука	82,0	—"
139. Сом канальный	<i>Ictalurus punctatus</i> Raf.	сом канальный	84,0	7-я группа – более 82 %, но не более 84 %
140. Тилапия	<i>Tilapia</i> sp.	тилапия	84,0	—"
III. Морские беспозвоночные (кальмары, креветки, гребешки, мидии)				
141. Трубач лирата	<i>Neptunea lyrata</i>	трубач	72,0	3-я группа – 76% и менее

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
142. Трубач Варицифера	<i>Neptunea variciphera</i>	трубач	76,0	3-я группа – 76% и менее
143. Шримс травяной (чили м травяной)	<i>Pandalus latirostris</i>	шримс травяной (чили м травяной)	76,0	—"
144. Кальмар тихоокеанский	<i>Todarodes pacificus</i>	кальмар тихоокеанский	78,0	4-я группа – более 76 %, но не более 78 %
145. Кальмар аргентинский иллекс	<i>Illex argentinus</i>	кальмар аргентинский иллекс	78,0	—"
146. Кальмар Бартрама	<i>Ommastrephes bartrami</i>	кальмар Бартрама	78,0	—"
147. Кальмар лолиго	<i>Loligo vulgaris</i>	кальмар лолиго	78,0	—"
148. Трубач уникум	<i>Clinopegma unicum</i>	трубач	78,0	—"
149. Креветка северная	<i>Pandalus borealis</i>	креветка северная	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
150. Креветка-шримс	<i>Sclerocrangon salebrosa</i>	креветка-шримс	80,0	—"
151. Гребешок морской	<i>Pecten yessoensis</i>	гребешок морской	80,0	—"

Наименование основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных			Допустимое содержание влаги, %, не более	№ группы, доля влаги, в %
русское	латинское	товарное		
1	2	3	4	5
152. Креветка северная розовая (глубоководная)	<i>Pandalus borealis</i>	креветка северная розовая	80,0	5-я группа – более 78 %, но не более 80 %
153. Мидия	<i>Mytilus edulis</i>	мидия	80,0	—"
154. Краб камчатский	<i>Paralithodes camtschaticus</i>	краб камчатский	82,0	6-я группа – более 80 %, но не более 82 %
155. Краб синий	<i>Paralithodes platypus</i>	краб синий	82,0	—"
156. Краб-стригун	<i>Chionoecetes opilio elongatus</i>	краб-стригун	83,0	7-я группа – более 82 %, но не более 83 %
157. Макстра сахалинская (белая ракушка)	<i>Spisula (Macra) sachalinensis</i>	макстра сахалинская	83,0	—"
158. Осьминог	<i>Octopus dofleini</i>	осьминог	84,0	8-я группа – более 83 %, но не более 84 %
159. Кальмар гигантский	<i>Dosidicus gigas</i>	кальмар гигантский	86,0	10-я группа – более 86 %